



SOINS PIERCING TETON

Bijou posé : _____

Date: _____

Temps d'inflammation : 1 à 2 mois

C'est le temps que met votre corps à réagir et accepter le bijou, tel un corps étranger, avec les gênes que cela implique :

- gonflement, sensibilité, fragilité, écoulement de lymphes (liquide jaune ambré).

Temps de cicatrisation : 6 à 12 mois

C'est le temps que va mettre la peau pour retrouver son aspect initial.

LES SOINS :

- un savon antibactérien : pour le nettoyage de la plaie,
 - du sérum physiologique : pour le rinçage et l'hydratation de la plaie.
- Attention : certains produits antiseptiques tel que la Biseptine, ne sont pas adaptés à un usage localisé sur le mamelon et le téton. Préférez un savon antibactérien moussant type Bétadine Scrub 4%.
- Durée du soin: 2 mois minimum

Fréquence : 2 fois par jour, matin et soir :

- il est essentiel de bien se laver les mains,
- retirez les sécrétions ramollies avec une compresse imbibée de sérum physiologique (pour les premiers temps),
- faites mousser le savon antibactérien dans vos mains et appliquez-le sur la zone percée pour que le savon pénètre,
- rincez abondamment à l'eau claire afin d'enlever tous dépôts de savon. Séchez puis hydratez avec du sérum physiologique,
- enfin, bien sécher la plaie en externe, à l'aide d'une compresse sèche et/ou d'un coton de tige, ou encore à l'aide d'un sèche cheveux : le risque d'infection augmente si la plaie reste humide.

En accord avec les règles d'hygiène les plus élémentaires, le perceur déconseille pendant votre temps d'inflammation, un certain nombre de choses comme :

- la baignade en piscine (autant pour le chlore que pour les nombreux germes) ainsi que le sauna sont déconseillés pendant les 10 premiers jours par la suite après une baignade une douche est obligatoire,
- En règle générale la douche est préférable au bain,
- les vêtements serrés, à grosses mailles, qui peluchent pour éviter d'encombrer la plaie et le bijou de fibres de tissu,
- l'abus d'alcool et la consommation de drogues chimiques : les substances actives présentes dans le sang ne faciliteront pas la cicatrisation,
- l'utilisation de certains produits sur votre nouveau piercing : l'eau oxygénée, l'alcool à 70° et 90° (risque de brûlure des tissus), le dakin, les crèmes cicatrisantes, les pansements, ou les savons parfumés, pour éviter de laisser quelque chose de gras, de synthétique sur la plaie ou tout simplement pour la laisser respirer.

Une fois cicatrisé, ne pas porter de bijoux trop courts (risque de rejet).

Changement de bijou possible après 3 mois.

Après une quinzaine de jours, une visite de contrôle chez votre perceur est conseillée.

Nous assurons le suivi de votre piercing jusqu'à sa cicatrisation définitive.

Un doute, un contrôle, des questions, n'hésitez pas à venir nous voir c'est gratuit.